Compétences - Mesurer le pH d'une solution aqueuse
exigibles : - Mettre en œuvre une démarche expérimentale pour déterminer une constante d'acidité

1 Mesure du pH d'une solution aqueuse d'acide éthanóique

On dispose d'un volume $V = 100 \text{ mL}$ d'une solution d'acide éthanóique de concentration molaire $c_0 = 5,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$ que l'on a obtenu en mélangeant de l'acide éthanóique pur avec de l'eau.

✎ 1. Ecrire l'équation chimique de la réaction de l'acide éthanóique avec l'eau en complétant le tableau d'avancement ci-dessous :

(en mol)	avancement	+	=	+
état initial	$x = 0$		en excès	
en cours	x			
état final	SI TOTALE : x_{max}			
	REEL : x_f			

✎ 2. Exprimer la concentration en ion oxonium $[\text{H}_3\text{O}^+]$ en fonction de l'avancement x et du volume V de la solution.

✎ 3. Déterminer l'expression de l'avancement maximale x_{max} si la réaction est totale.

✎ 4. Rappeler l'expression du pH en fonction de la concentration en ion oxonium $[\text{H}_3\text{O}^+]$. En déduire la valeur théorique du pH attendu (c'est-à-dire dans la solution à l'état final) si la réaction est totale.

☞ Mesurer la valeur du pH de la solution.

Appel n°1	Appeler le professeur pour vérifier vos réponses et votre mesure de pH
---	---

✎ 5. La valeur du pH mesuré est-elle en accord avec la valeur théorique attendue ? En déduire alors la valeur de l'avancement final réel x_f dans l'état final.

✎ 6. Expliquer pourquoi on parle ici de **réaction limitée** et non de réaction totale. Faire la liste des espèces chimiques présentes dans l'état final, donc présentes dans la solution aqueuse d'acide éthanóique.

2 Détermination de la constante d'acidité du couple $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$

Document 1 Constante d'acidité K_a

Chaque couple acide/base, AH/A^- , est caractérisé par une **constante d'acidité** notée K_a . C'est une constante associée à la réaction de l'acide AH de ce couple avec l'eau. Cette constante est propre à chaque couple, elle ne

dépend que de la température, elle est sans unité et s'écrit : $K_a = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]_f \times [\text{A}^-]_f}{[\text{AH}]_f}$.

Les grandeurs (sans unités) entre crochets sont équivalentes aux concentrations molaires exprimées en mol.L^{-1} .

On utilise aussi la grandeur pK_a telle que $pK_a = -\log K_a$.

✎ 7. En utilisant les résultats du tableau d'avancement de la partie 1, déterminer la valeur de la constante d'acidité du couple acide éthanóique / ion éthanóate.

✎ 8. En déduire la valeur du pK_a de couple.

Appel n°2	Appeler le professeur pour vérifier vos réponses ou en cas de difficulté
---	---

3 Analyse des résultats et incertitude de répétabilité

9. Comparer votre valeur déterminée expérimentalement à la valeur donnée dans les tables de chimie (à 25°C) : $pK_a(\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-) = 4,75$.

Document 2 Incertitude de répétabilité

L'incertitude $U(x)$ appelée dans ce cas incertitude de répétabilité est liée à l'écart-type σ de la série de mesures, au nombre n de mesures indépendantes et au facteur d'élargissement k qui dépend du faible nombre de mesures réalisées et du niveau de confiance choisi. L'incertitude de répétabilité $U(x)$ est estimée selon la formule : $U(x) = k \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$.

La valeur du facteur d'élargissement k figure dans un tableau (donné en exemple ci-dessous pour n allant de 2 à 16) issu de la loi statistique dite « loi de Student ».

n	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
$k_{95\%}$	12,7	4,30	3,18	2,78	2,57	2,45	2,37	2,31	2,26	2,23	2,20	2,18	2,16	2,15	2,13

10. Récupérer dans le tableau ci-dessous les valeurs de pK_a des autres groupes de TP (en attendant, pour les plus rapides, faire la partie 4.).

groupe n°	1	2	3	4	5	6	7	8
pK_a								

11. Déterminer la valeur moyenne $pK_{a,m}$ ainsi que l'incertitude de répétabilité $U(pK_a)$ liée à cette série de mesures. Ecrire le résultat sous la forme $pK_a = pK_{a,m} \pm U(pK_a)$.

12. Comparer de nouveau le résultat précédent à la valeur donnée dans les tables de chimie. Conclure.

Appel n° 3

Appeler le professeur
pour vérifier vos réponses ou en cas de difficulté

4 Pour les plus rapides : pH de solutions diluées d'acide éthanóique

Préparer deux solutions diluées d'acide éthanóique à partir de la solution mère précédente :

- 100,0 mL d'une solution de concentration $c_a = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$
- 50,0 mL d'une solution de concentration $c_b = 5,0 \times 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$.

Chacun des deux binômes réalisera intégralement l'une des deux solutions en ayant au préalable réfléchi au protocole opératoire.

Mesurer le pH de ces deux solutions filles et compléter le tableau ci-dessous :

	Solution mère	Solution fille a	Solution fille b
Concentration molaire (mol.L^{-1})	$5,0 \cdot 10^{-2}$	$1,0 \times 10^{-2}$	$5,0 \times 10^{-3}$
pH mesuré			
pK_a du couple déduit			

13. En déduire, pour les deux solutions filles préparées, et de la même façon que dans la partie 1, la valeur du pK_a du couple acide éthanóique / ion éthanóate. Compléter la dernière ligne du tableau.

14. Conclure en associant chacun des débuts de phrase avec une ou plusieurs fin(s) :

Le pH d'une solution dépend	de la concentration molaire apportée en acide de la solution
Le pK_a d'un couple	dépend du couple acidobasique considéré